


5. 脳血管障害

- 疾患名：脳内出血（クモ膜下出血）
- アウトライン：

「55 歳男性。高血圧のためバルサルタンによる薬物治療を受けるが、ノンコンプライアンスにより突然の頭痛、意識障害。救急搬送の結果、脳内出血。徐脈、高血圧、瞳孔は左右不同が確認される。また、状態悪化に陥った際、不整脈が出現し、心停止、救命対応が必要となる。」
- LLEAP 情報：
 - ✓ 受講者への概要：55 歳男性。高血圧のため薬物治療を受けているが、ノンコンプライアンスによる容態急変のため救急搬送。患者の容態変化と治療における効果の確認を行う。また、心停止ケースに陥った際には、救命対応を実施する。
 - ✓ 学習目標：全身観察、瞳孔反射や脈拍のリズム、また救命対応について理解する。
 - ✓ 名前：徳永 仁志（とくなが ひとし）
 - ✓ 身長：170 cm
 - ✓ 体重：80 キロ



(処方)
ディオバン錠 80 mg ^(注 1) 1 回 1 錠 (1 日 1 錠)
1 日 1 回 朝食後 7 日分
(注 1: バルサルタン 80 mg を含む錠剤)

(処方)
ペルジピン注射液 25 mg ^(注 2) 0.5 μ g/kg/分 点滴静注
グリセオール注 200 mL ^(注 3) 1 本 1 時間で点滴静注
1 日 4 回
(注 2: ニカルジピン塩酸塩 25 mg を含む注射液)
(注 3: 濃グリセリン 20 g と果糖 10 g の配合注射液)

シムマン 3G を使用したコアカリ提示代表的 8 疾患シナリオプログラム 解説

● 高機能患者シミュレータ SimMan 3G への詳細なプログラム設定の内訳

	A	B	C	D	E	F
心音 A	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90
P	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90
T	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90
M	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90	標準 90
前肺音右上	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20
右中	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0
右下	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0
左上	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20
左下	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0
後肺音右上	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20
右下	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0
左上	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20	標準 20
左下	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0	標準 0
腸音	標準 50	標準 50	標準 50	標準 50	標準 50	標準 50
心電図	洞調律	洞徐脈	洞調律	脈あり 心室頻 拍/無	心室細 動/心 静止	洞調律
脈拍(/min)	68 整	38 整	76 整	180 整	-	40 整
血圧(mmHg)	166/92	199/108	119/56	60/30	-	60/40
呼吸数(/min)	16	24	18	6	-	8
SpO ₂ (%)	99	97	98	80	-	75
体温(°C)	36.5	35.8	36.2	35.4	35.4	35.9
その他（痙攣）		○				
声（悲鳴を伴った頭痛・嘔吐）		○				
その他（瞳孔左右不同）		○				
チアノーゼ				○	○	
閉眼				△	○	

心音、肺音、腸音の数値は、スピーカーから流れる音量（％）を示している。